果樹品種

水蜜桃 46

梨 47

楊 桃 48

荔 枝 50

芒 果 52

印度棗 53

木 瓜 53

番石榴 56

百香果 56

鳳 梨 57

水蜜桃台農選1號

台農甜蜜

親本來源：巴西引進品種 Premier

育種人員：歐錫坤、蔡 竷
林學正、蕭吉雄
徐信次、溫英杰

命名日期：1991年5月20日

品種特性

需冷量150小時，適合淺山坡地種植，平均果重約90公克左右，屬中果型，外觀圓整，果皮鮮紅色，果肉白色帶紅，溶質、細緻多汁、半離核、含酸量低，具有水蜜桃風味。自花親和性高，易結果，產量穩定，果實發育日數96~99天，屬中熟種，平均糖度約12.0°Brix，酸度0.34%。唯果實偏小是其缺點。

平地水蜜桃台農選1號果實

推廣現況

爲台灣低海拔地區主要栽培品種，品質深受肯定，栽培面積約6百公頃，以中部地區爲主要生產區域。

果樹

水蜜桃台農1號

春蜜

親本來源：Premier × Flordabelle

育種人員：歐錫坤、溫英杰
宋家瑋

命名日期：2001年6月6日

品種特性

果實發育日數約81~86天，屬早熟種。果重平均約130公克，最大果重212.7公克，屬極大型果，市場售價高。酸含量僅0.42%，屬低酸品種，糖酸比高，味甜。果肉溶質，成熟時有水蜜桃風味，品質優良。需冷量180小時，適合台中地區淺山坡地種植。少數果實有裂核現象，果實肉質稍粗，有時略帶苦澀味，枝條具盲芽現象。

平地水蜜桃台農1號果實

推廣現況

採收期較台農選1號早1至2星期左右，售價較高，以生產早熟桃爲主要目的。栽培地區以中部淺山坡地區爲主，栽培面積約3百公頃。

水蜜桃台農2號

夏蜜

親本來源：Premier × Flordared

育種人員：歐錫坤、宋家瑋
蕭吉雄、劉明櫶

命名日期：2005年6月23日

品種特性

果實發育日數約106~139天，屬中晚熟種，盛產期比台農甜蜜晚2~3星期左右。果重平均200公克以上，屬極大型果。果形圓，果頂圓，縫合線淺，果實對稱性佳。有茸毛，果皮紅，著色較少(約30~50％)，底色乳黃，易剝皮。果肉白色，近核處色少，汁液多，軟溶質，纖維少，肉質細緻。香氣濃、糖度高(12.5ºBrix)、酸度低(0.41%)、風味甜。核爲離核，橢圓形，紅棕色，核面大窪。需冷量約125CU，樹勢強壯，樹姿約30~45度呈半開。適合台灣中、北部地區的平地與淺山坡地種植。

平地水蜜桃台農2號果實

推廣現況

採收期較台農選1號爲晚，於5月底至6月上旬成熟採收，爲中晚熟品種。可分散並延長產期。適合栽培地區以中部淺山坡地爲主。目前授權員農種苗進行繁殖與販售。

果樹

梨台農1號

明福梨

親本來源：新世紀×橫山

育種人員：徐信次、莊耿彰
施昭彰

命名日期：1992年7月22日

品種特性

低需冷量、樹型開張、新葉葉柄基部紅色、3月上中旬開花、7月中下旬果實成熟、褐皮、果心小、糖度高、石細胞極少、脆細多汁不褐化、果實高溫下易軟化、不耐低溫儲藏。

推廣現況

目前栽培面積僅數公頃、對我國農業貢獻爲第一個低需冷量品種、因前述缺點故取代現有品種百分比極低、增加農業收入百分比極微。



明福梨果實不耐低溫儲藏，即使在12℃下放15天也會發生寒害

明福梨結果情形，不套袋外觀如橫山梨，但比其早熟2~3個月

梨台農3號

玉金香

親本來源：新世紀 × 橫山

育種人員：施昭彰、徐信次
莊耿彰、黃肇家

命名日期：2003年7月22日

品種特性

本品種爲低需冷性短果枝型綠皮品種，3月中旬開花，7月中旬採收，果實碩大，平均單果重約375公克，高接者可達800公克，果肉白中帶有微黃如玉，成熟時果色金黃，具有特殊優雅蘋果香氣(蜜香)，故名“玉金香”，肉質鬆脆多汁，糖度高，平均達12度以上，耐儲藏，儲藏力約2個月。

推廣現況

現正辦理品種專屬授權中，尚未推廣，以本品種已表現之優點，如以創新技術克服其缺點，充分發揮品種之特性，將取代甚而超越其母本新世紀之潛力，是綠皮梨中可能取代新世紀之唯一本土品種。

梨台農3號果實

果樹

楊桃台農1號

親本來源：二林、蜜絲、歪尾等品種混植園之實生變異

育種人員：王武彰、王德男
劉文哲

命名日期：1990年7月12日

品種特性

枝條柔軟、葉片大、短柱形花、果實大、長紡錘形、果皮光滑美觀、果皮果肉均黃白色、產量高、果稜厚、肉質細緻、風味清香、植株生長勢強。

推廣現況

目前栽培面積不變，因其皮色偏黃白色，且其果皮薄、容易碰傷、容易裂果及褐變等缺點，影響農民栽培意願。但可利用栽培管理來改善。

果實大，肉質細，風味清香可口

楊桃台農1號植株結果情形

楊桃台農2號

正港楊桃

親本來源：馬來西亞引進品種 (76-B-10)

育種人員：劉碧鵑、王德男

命名日期：2002年5月3日

品種特性

果實大、果形心臟形、果稜端正不歪扭、果稜肥厚飽滿、稜溝不明顯、果梗長、果皮亮麗光澤、種子數少、風味佳。產期與秤錘種相近，產量高，夏期果開花後約75天成熟，冬期果開花後約110天成熟。

楊桃台農2號果稜厚，果色橙黃，肉質細，風味佳

楊桃台農2號植株的著果情形，其果梗長，方便套袋

推廣現況

目前栽培面積約150公頃，主要分布於屏東里港及台南楠西一帶，推廣初期，本品種與秤錘種的價差每公斤達15元以上，每公頃收益可增加10~20萬元。

楊桃台農3號

紅龍楊桃

親本來源：引自Jakarta品系的種子實生後代 (品系代號為76-D-5)

育種人員：劉碧鵑、王武彰

命名日期：品種權申請中

品種特性

最大特色爲果皮橘紅色，與現有栽培秤錘種的金黃色，明顯區隔。八分熟採收之果實，糖度可達9.3°Brix以上，肉質細，具香味，口感甚佳。果稜硬，果實貯運性佳，室溫下之儲架壽命可達1星期。東方果實蠅較不喜危害，可延後套袋。始花期早，2~3月即可開花，但花期較不集中，每花序的花數亦較少，產量較低，冬期果會有寒害褐化情形。

推廣現況 尚未推廣。

台農2號與3號果實之比較

果樹

荔枝台農1號

翠玉荔枝

親本來源：黑葉 × 玉荷包

育種人員：張哲瑋、顏昌瑞
趙政男、徐信次
程永雄

命名日期：2004年6月8日

品種特性

樹形為圓頭形，枝條疏而長，分枝少，小葉長約12.0公分，小葉寬約3.8公分，形狀為披針形，葉尖形為漸尖，葉基為楔形，成熟葉片顏色為濃綠色，新梢葉片顏色為暗紅褐色。花穗長約35.9公分，花穗寬約27.2公分，單果重約22~25公克，果實形狀為心臟形，果皮顏色為綠中帶紅，果棘微深；果皮薄，重約3.1公克；果肉為白蠟色，肉質爽脆多汁清甜，果肉率約80％，可溶性固形物約18.3°Brix，可滴定酸為0.14％。種子為圓錐形，種子尾端尖，色澤為黑褐色；焦核率在50至100％之間，平均約70％；種子重0.4~1.0公克。果實成熟期在台灣南部為5月下旬，在中部為6月上旬；果實受育天數約為77至84天。

推廣現況

已於2005年4月完成品種授權。本品種由於品質優、產量穩定並且容易栽培，因此，農友栽培的意願十分強烈，各荔枝產區均有農友登記購買，目前以台中南投縣市最多，其次為嘉雲南地區。

果實品質優良，果肉率達80%，果皮顏色綠中帶紅

荔枝台農1號，栽培容易，產量高而穩定

果樹

荔枝台農2號

荔旺

親本來源：沙坑×玉荷包

育種人員：鄧永興 、賴秋弦

命名日期：2006年12月20日

品種特性

樹冠爲圓頭形，嫩葉爲紅褐色，成熟葉爲濃綠色，有光澤，大葉。成熟枝條爲灰褐色，新梢枝條爲綠色，節間長。花芽分化完成較親本玉荷包早，大花穗。果實性狀：小核，平均種子重1.16g，焦核率最高約50%，單果重在18~25g間，平均21.4g，果肉肉質優，糖度18~20ºBrix。果皮平滑，有龜紋狀，果棘不明顯。果實可食率(果肉率)76.8%。

推廣現況 尚未推廣

荔枝台農3號

玫瑰紅

親本來源：自然授粉實生苗，父母本可能是桂味或糯米滋

育種人員：張哲瑋、程永雄、徐信次、顏昌瑞

命名日期：2006年12月20日

品種特性

小葉葉緣呈波浪紋，雌蕊柱頭形狀成圓捲裂，果大、果重可達30公克，一般爲25公克左右；果皮鮮紅美豔，果皮縫合線明顯，縫合線兩邊的果皮會略微突起。果皮易從縫合線剝開，且剝開後果肉易從果蒂脱落，因此食用時，果肉及果汁不沾手，安全衛生；果肉細緻；口感Q，果肉具有如玫瑰般的特殊香氣，因此果實品質優良。此外本品種爲晚熟種，採收日期爲6月21日至7月11日，較黑葉晚2~3週。

推廣現況 剛命名尚無推廣。

台農3號(75-S-1-4)果皮易從縫合線剝開，果肉及果汁不沾手

台農3號果實果皮鮮紅美豔，果肉細緻；口感Q，因此果實品質優良

果樹

芒果台農1號

親本來源：實生苗選育

育種人員：曾錫恩

命名日期：1985年6月19日

品種特性

植株較矮，枝梢較短，葉片略爲捲曲，呈波浪狀，抗風力強，著果率高，果實中小型，重約200克，成熟時果皮金黃色，略帶粉紅，相當美觀。可採收樹上完熟果或8~9分熟時採收催熟，爲現有品種中最易催熟的品種，甜度達16~22°Brix，有土檬果之濃烈香味。果肉稍硬，耐運輸，水分較少，貯藏性佳，種子佔果肉之12％，品質極佳，對炭疽病之抗病性強，爲省工栽培之最佳品種。

推廣現況

目前種植面積約419公頃，約佔台灣芒果生產面積2％。

果皮金黃帶粉紅，香氣獨特十分討喜

芒果台農1號著果佳，生理落果少

芒果台農2號

親本來源：實生苗選育

育種人員：曾錫恩

命名日期：1985年6月19日

品種特性

早熟種，5~7月果實成熟，果蒂突起成尖橢圓型其爲最明顯之的特徵，果實平均重319公克，果肉黃色，糖度18°Brix左右，種子稍大，佔果實的12%，因結實率低，目前栽培者較少。

推廣現況

目前僅趣味栽培，未有專業生產。

金黃色的果皮，果蒂突起成尖橢圓型為其特徵

芒果台農2號，結實率稍低

印度棗台農1號

高朗2號

親本來源：高朗1號芽條變異

育種人員：張麗華、黃全和、黃慶安

命名日期：1998年12月22日

品種特性

葉色濃綠，莖色灰褐，枝條柔軟富彈性，結果枝刺短且少，容易栽培管理，本品種屬早生品種，開花早，花期長，正常花比例高，產量穩定，其果實碩大，平均果重130分克，呈扁長四方形，果皮翠綠色具光澤，肉質清甜多汁，適合高屏地區栽培。

推廣現況

目前台農1號已被蜜棗等新品種(系)所取代，現無經濟栽培，僅供授粉樹之用。

台農1號果型呈偏長四方型

台農1號結果情形

木瓜台農1號

親本來源：哥斯達黎加×日陞

育種人員：王德男、曹溪明

命名日期：1981年5月29日

品種特性

生育強健，果皮光滑，肉紅艷麗有特殊香味，耐貯運，對病毒病抵抗性較強，適生食及加工。

推廣現況

推廣面積曾達200~300公頃。因具特殊氣味國人較難接受；目前僅零星栽培，但在中南美爲主要栽培品種。



台農1號木瓜及其父本哥斯達黎加紅肉與母本日陞種之雌性果及兩性果之剖面

果樹

木瓜台農2號

親本來源：泰國×日陞

育種人員：王德男、曹溪明

命名日期：1981年5月29日

品種特性

早生，形佳，豐產，大小適中，肉紅艷麗多汁，氣味清爽，近年來最受歡迎，爲台灣最主要木瓜栽培品種。

推廣現況

台灣最主要栽培品種，栽培面積每年約3~4千公頃，佔總生產面積80~90%，爲網室木瓜之重要品種。

木瓜台農2號之雌性果(上)及兩性果(下)之外型及剖面

木瓜台農2號之植株，矮生豐產情形

果樹

木瓜台農3號

親本來源：菲律賓×日陞

育種人員：王德男、曹溪明

命名日期：1981年5月29日

品種特性

矮生，果大(平均果重1.3公斤)產量高(株年產量35公斤)肉橙黃，肉厚，質優，對氣候土適應性廣。

推廣現況

命名推廣時，台灣木瓜市場喜黃肉木瓜，故曾爲主要栽培品種，後因消費者較喜愛紅肉品種使栽培漸少，目前幾無栽培。



木瓜台農3號及其父本菲律賓種與母本日陞種之雌性果(左)及兩性果(右)之剖面

木瓜台農3號矮生，豐產之結果情形

木瓜台農5號

親本來源：Florida 77-5 × Costa Rica

育種人員：王德男、翁國斌

命名日期：1987年9月7日

品種特性

耐病毒病、矮生、早熟、葉柄及嫩莖紫紅色，肉紅艷麗，汁多，產量高，畸形果少。

推廣現況

栽培面積曾達2千公頃，推廣初期，產量及收益倍增，後因推廣網室栽培，台農5號品質及貯運性比台農2號差，栽培漸少，目前僅少量栽培。

木瓜台農5號之雌性果(下)及兩性果(上)之果型及剖面

木瓜台農5號矮生豐產之結果情形

木瓜台農6號

親本來源：蘇魯1號×日陞

育種人員：王德男、翁國斌

命名日期：1998年3月31日

品種特性

矮生、莖節間短（1.9公分），結果部位低（67.9公分），適於網室栽培，結果力強（55.5果/株），果肉色深紅艷麗，肉厚，平均果重444.6公克，兩性株畸形果僅0.26%，5月至6月少有「橡皮肉」現象。

推廣現況

栽培面積曾達1千公頃，因果肉比台農2號紅且糖度亦較高，售價比台農2號倍增，但因果小，採收及包裝費工，且果蒂容易軟，較不耐貯運，栽培漸少，目前僅少面積栽培。

木瓜台農6號之兩性果其果型梨形，果肉色深紅艷麗、肉厚



木瓜台農6號矮生豐產之結果情形

果樹

番石榴台農1號

帝王拔

親本來源：珍珠拔 × 小葉無籽拔

育種人員：謝鴻業、連麗仙

命名日期：2006年9月29日

品種特性

易抽生結果枝，著果穩定。果實表面凹凸明顯，果肉厚且脆，但質地較珍珠拔略粗，酸度略高，果腐率較高。果實品質因栽培管理不同差異極大，維生素C含量最高達266mg/100mg，糖度最高達21°Brix。果實屬非更年型，1℃爲適合之貯藏溫度，貯藏壽命四星期，但回溫後果皮容易褐化，儲架販售最好保持低溫狀態。

推廣現況 目前正推廣中。

果樹

百香果台農1號

親本來源：黃色百香果×紫色百香果 *P. edulis f. flavicarpa* × *P. edulis*

育種人員：林瑩達

命名日期：1982年4月

品種特性

本品種係以紫色百香果爲母本，黃色百香果爲父本，雜交F_1選育出。其生育特性、產量及品質均介於兩親本之間，生長旺盛，耐濕性，抗病性稍強，莖葉及葉柄葉脈稍帶紫紅色，捲鬚綠色先端帶紫紅色，花器構造近似紫色種，柱頭隨開花時間而向下彎曲，具有自交親和性，容易由蜜蜂訪花而自然結果，自然結果率在60%以上。果實成熟時，果皮呈鮮紅色，果皮光滑，較黃色種薄，具有細密的白點，平均果重約65公克，果汁濃黃色，香氣濃郁，酸度比黃色百香果低，約3%，果汁率可達33%，單株平均產量可達20公斤左右，每公頃產量約20,000公斤。

果汁濃黃，香氣濃郁，食味佳

百香果台農1號果皮光滑細緻

推廣現況

目前種植面積約250公頃，本品種約佔台灣百香果生產面積90%以上。

鳳梨台農11號

香水鳳梨

親本來源：開英種(Smooth Cayenne)與黃模里西斯(Yellow Mouritius)雜交之後代F_1中選育出41-1品系

育種人員：林榮貴、林瑩達、王武彰、張雙滿

命名日期：1986年7月20日

品種特性

植株較矮小，株高80~90公分；葉短小狹窄，灰白綠色，被覆較厚之蠟質層，除了葉尖有少許刺外，葉緣無刺；果實圓筒形，果重0.6~1.0公斤，果目較小而微凸，花腔淺，果皮薄，果皮鮮黃色，成熟轉色快，果肉淡黃色，纖維少，汁多，糖度及酸度均高，糖酸比適中，具有特殊之濃郁香氣，俗稱香水鳳梨，耐貯運，鮮食用，適合生產4~6月採收之春果。因植株小，宜密植，每公頃45,000~48,000株，但需重肥，且需注意秋天太晚栽種，植株發育緩慢，若種苗老熟，種植當年開花，所結的果實無商品價值。本品種耐寒性稍差，僅適合在高、屏地區栽植。

推廣現況

本品種於1986年命名推廣後，因其果實具有香氣，品質佳，頗適合當時鮮食消費市場之需，試銷日本市場後，頗受好評，由於裔芽數多，繁殖率高，推廣面積增加迅速，但本品種耐寒性稍差，在嘉義以北地區栽植，栽植時期較晚，或管理稍有疏忽，果實小，產量低，因而逐漸被台農17號等品種取代。目前僅在屏東地區尚有少面積(約20公頃)契約栽培，專供外銷日本用。

植株低矮，葉幅稍窄，葉緣無刺，僅葉尖有少許刺，裔芽3～5枚

果實圓筒形，果皮金黃色，果目淺，果肉黃白色，具特殊香氣

鳳梨台農13號

冬蜜鳳梨

親本來源：正常開英種 × 台農8號

育種人員：張清勤、徐信次、程永雄、李良

命名日期：1994年3月12日

品種特性

平均株高127.5公分，葉長104公分，葉寬5.1公分，生長較直立，葉緣無刺，葉片表面草綠色，中軸略帶紫紅色。果重平均1.2公斤，略爲圓錐形，小果數53~161個，果目略突，苞片長，紫紅色。果梗短，果實不易倒伏。果皮薄，芽眼(花腔)淺，肉色金黃，質緻密，纖維稍粗，糖度高15.7°Brix，酸度低0.27%，糖酸比58，鳳梨特有風味濃。適合8月至翌年2月生產。

推廣現況

冬蜜鳳梨果實酸度低，是目前唯一建議於冬季生產之品種，目前栽培面積約6百公頃，分佈於本省主要鳳梨產地，現以屏東地區栽培較多。本品種之推廣有助於本省鳳梨周年化生產之目標。

A | B / C 鳳梨台農13號植株及果實(A)花序(B)果實縱切面(C)

鳳梨台農16號

甜蜜蜜鳳梨

親本來源：正常開英種× Rough

育種人員：張清勤、徐信次
官青杉、程永雄

命名日期：1995年5月6日

品種特性

平均株高90.6公分，葉長84公分，葉寬5.8公分，葉緣無刺，葉表面中軸呈淺紫紅色，有隆起條紋，邊緣綠色。果重平均1.3 公斤，長圓錐形，小果數93~260個，果目突起，成熟果皮桔黃色。果肉黃或淡黃色，纖維少(幾無粗纖維)，肉質細緻，糖度高18°Brix ，酸度0.47 %，糖酸比38 ，具特殊風味。適合4~7月生產。

推廣現況

台農16號甜蜜蜜鳳梨果實纖維少風味濃郁，在夏季已取代部分開英種鳳梨的生產，本省主要鳳梨產地皆有栽培，其中以屏東縣、台南縣及嘉義縣栽培較多。

果樹

A B/C 鳳梨台農 16 號植株及果實(A)花序(B)果實縱切面(C)

鳳梨台農17號

金鑽鳳梨

親本來源：正常開英種× Rough

育種人員：張清勳、官青杉
徐信次、程永雄

命名日期：1998年4月10日

品種特性

平均株高89.7公分，葉長78.7公分，葉寬5.2公分，葉緣無刺，葉面略呈褐色，兩邊及下半段爲草綠色。平均果重1.48公斤，圓筒形，整齊美觀，小果數105~198個，果目扁平，成熟果皮黃且稍帶紫紅色，果皮薄，芽眼(花腔)淺，果肉黃或深黃，質緻密，纖維中，果心稍大，但細嫩可食，糖度14.5ºBrix，酸度低0.28 %，糖酸比50，風味與口感均佳。適合3~5月生產。

推廣現況

金鑽鳳梨春季的果實品質佳，深受栽培者及消費市場歡迎。目前已取代開英種、台農4號及台農6號，成爲本省栽培面積最多的鮮食品種。本品種由於貯運性佳除供應國內消費市場外，亦是目前主要的外銷鳳梨品種。

果樹

A B C 鳳梨台農17號植株及果實(A)花序(B)果實縱切面(C)

鳳梨台農18號

金桂花鳳梨

親本來源：正常開英種 × 1-A-1

育種人員：張清勳、官青杉
徐信次、程永雄

命名日期：2000年5月5日

品種特性

平均株高72.7公分，葉長77.3公分，葉寬5公分，葉緣無刺，葉片表面綠色，中軸稍呈暗紅色，平均果重1.48公斤，果實圓錐形，小果數86~237個，果皮青綠成熟時轉爲鮮黃色。果皮薄，芽眼(花腔)淺，果肉黃或金黃色，質緻密，纖維中，糖度13°Brix、酸度低0.25 %，糖酸比39，具桂花香氣，風味佳。適合4~7月生產。

推廣現況

金桂花鳳梨果實具桂花香氣，生產過程中黑目病發生率低，可取代部分產地開英種及台農16號鳳梨生產夏季果實。

果樹

A B C 鳳梨台農18號植株及果實(A)花序(B)果實縱切面(C)

鳳梨台農19號

蜜寶鳳梨

親本來源：正常開英種×Rough

育種人員：張清勤、官青杉
徐信次、程永雄

命名日期：2001年5月22日

品種特性

平均株高87.7公分，葉長82.8公分，葉寬6.1公分，葉緣無刺，葉片暗濃綠色，表面中軸微帶暗紫色。平均果重1.61公斤，圓筒形，小果小且數目多，成熟時果皮略帶暗灰色。果皮薄，芽眼(花腔)淺，果肉黃或金黃色，肉質緻密細嫩，纖維細，糖度高16.8°Brix，酸度0.45%，糖酸比37.8，風味佳。適合4~7月及10~11月生產。

推廣現況

台農19號蜜寶鳳梨果實風味濃郁，植株對萎凋病抗性較強，適合生產夏秋兩季果實，可滿足目前秋季消費市場需求，達到分散產期之目的。

A B C 鳳梨台農19號植株及果實(A)花序(B)果實縱切面(C)

鳳梨台農20號

牛奶鳳梨

親本來源：從夏威夷引入之未知名品種的族群變異中選育出。

育種人員：林榮貴、黃季春、王德男、劉政道

命名日期：2004年8月10日

品種特性

植株高大，葉緣完全無刺，栽培管理方便；果實平均重約2公斤，圓筒形，果肉呈罕見之乳白色，肉質細緻，汁多，纖維少，糖度高，酸度低，風味佳，最適合生產5~10月採收之夏果，鮮食用。

推廣現況

目前栽培面積約300公頃，正逐年增加中，本品種推出後，使台灣的鳳梨品種更加多樣化， 生產者可在不同季節生產不同品種，延長供果期，本品種5~10月採收之果實品質最佳，使消費者可享受高品質之水果，果農的收益提高，除國內鮮食消費外，近年來少量外銷日本，獲得相當高的評價，未來發展潛力極大。

鳳梨台農20號的果實圓筒形，果目大而平

果肉呈罕見之乳白色

鳳梨台農21號

黃金鳳梨

親本來源：C64-4-117(Smooth Cayenne × 台農4號) × C64-2-56 (Smooth Cayenne × Rough)

育種人員：官青杉、張清勤、蔡惠文、唐佳惠、徐信次、程永雄

命名日期：2005年6月29日

品種特性

平均株高79.8公分，葉長76.4公分，葉寬5.7公分，葉緣無刺僅葉片尖端有小刺，葉片表面翠綠色。果實圓筒形，平均果重1.34公斤，小果目較大且數目多，果實發育後期果皮呈現綠色，成熟時轉爲鮮黃色。果皮略厚，芽眼(花腔)略深，果肉黃至金黃色，肉質緻密細嫩，纖維中等，糖度高18.4°Brix、酸度0.63 %，糖酸比30.7，風味佳。適合4~11月生產。

推廣現況

黃金鳳梨果實風味濃郁，適合生產夏秋兩季果實，可取代部分在夏季會裂梗、裂果及斷心之品種，以減少生產者損失，並滿足鮮食鳳梨品種的多樣化。

A B C 鳳梨台農21號植株及果實(A)花序(B)果實縱切面(C)

果樹